



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

27–31 тижні

(01.07–04.08.2024)

Дата випуску:
06.08.2024

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 27–31 тижні по Україні

- За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 1 липня по 4 серпня 2024 року були на міжсезонному рівні.
- Зареєстровано 232 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), та 200 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ); пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин був у межах 0,7–0,8%.
- За результатами лабораторних досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси грипу типу В, SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси, риновіруси, метапневмовіруси, RS-віруси.
- У системі дозорного епідеміологічного нагляду не зареєстровано летальних випадків унаслідок грипу та серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (27–30 тижні)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://flunewseurope.org>) станом на 30 тиждень лише у Словаччині зареєстровано низьку активність грипу, серед інших країн-сусідів спостерігали фонову інтенсивність епідемічного процесу.

Циркуляція вірусів грипу в країнах-сусідах станом на 30 тиждень відсутня.

Румунія та Угорщина не надавали відомостей про реєстрацію випадків захворювання на грип (рис. 1).




Рис. 1. Географічне поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 30 тиждень 2024 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

На 30 тижні 2024 року 26 країн Європи взяли участь у моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO). В Італії та Кіпрі зареєстровано перевищення низького рівня смертності з усіх причин. Водночас у Греції визначено високий рівень надлишкової смертності.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Результати аналізу можуть різнитися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, і затримки реєстрації випадків.




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи зі щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах — партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають відомості, 30 тиждень 2024 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюють у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ — Київ, Суми та Чернігів, схід — Дніпро і Харків, південь — Запоріжжя й Одеса, захід — Львів, Рівне і Чернівці, центр — Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

¹ Z-показник надлишкової смертності — стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами чи регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу.

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2024 року зареєстровано 232 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, зокрема 56 (24,1%) дітей віком до 17 років. З-поміж 232 пацієнтів із ГПЗ у 123 (53%) було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій (рис. 3).



Рис. 3. Щотижневий розподіл випадків ГПЗ серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), станом на 31 тиждень 2024 року

За результатами лабораторного дослідження 123 зразків матеріалів у 24 (19,5%) випадках отримано позитивні результати (табл. 1).

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ за 27–31 тижні 2024 року

Регіон	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтип.	Грип А(H1) pdm09	Грип А(H3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи
Вінницька	29					3	
Дніпропетровська	17					4	1
Запорізька	2						
Київ							
Кіровоградська							
Львівська	13					2	
Одеська	15				1	3	3
Рівненська	1						
Сумська	20					4	2
Харківська	1						
Чернівецька							
Чернігівська	25						1
Усього	123				1	16	7

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного періоду зареєстровано 200 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, зокрема 131 (65,5%) дитину віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин упродовж 5 тижнів був у межах 0,7–0,8% (рис. 4).




Рис. 4. Щотижневий розподіл випадків ТГРІ серед дозорних закладів України (агреговано), станом на 31 тиждень 2024 року

З-поміж 200 випадків ТГРІ у 107 (53,5%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження у 27 (25,2%) випадках отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГРІ за 27–31 тижні 2024 року

Регіон	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтип.	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи
Вінницька	9					3	
Дніпропетровська	2						
Запорізька							
Київ	14					1	2
Кіровоградська	5						2
Львівська	24					1	
Одеська	2						
Рівненська	1						
Сумська	22				1	1	13
Харківська	5					1	1
Чернівецька	2						
Чернігівська	21						1
Усього	107				1	7	19