



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

32–35 тижні

(05.08–01.09.2024)

Дата випуску:
03.09.2024

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 32–35 тижні по Україні

- За даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 5 серпня до 1 вересня 2024 року були на міжсезонному рівні.
- Зареєстровано 260 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), і 526 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ); пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин перебував у межах 2,2%.
- За результатами лабораторних досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси грипу А не субтиповані, SARS-CoV-2, аденовіруси, риновіруси, RS-віруси.
- У системі дозорного епідеміологічного нагляду не зареєстровано летальних випадків унаслідок грипу. Серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, сталося 12 летальних випадків.

Захворюваність на грип і ГРВІ та моніторинг рівня підвищеної смертності в сусідніх країнах (32–34 тижні)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://flunewseurope.org>) станом на 34 тиждень серед країн-сусідів були фонові інтенсивність епідемічного процесу та відсутня циркуляція вірусів грипу.

На 34 тижні 2024 року 26 країн Європи взяли участь у моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO). У Греції, Італії та Швейцарії зареєстровано підвищення смертності з усіх причин низького рівня у вікових групах старше 75 років, що може бути пов'язано зі збільшенням захворюваності на COVID-19 у липні — серпні (рис. 1). Водночас у дозорних ЗОЗ первинної та вторинної ланок частка позитивних результатів досліджень на SARS-CoV-2 досягла пікових значень, а в більшості країн/територій почала знижуватися.




Рис. 1. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи зі щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах — партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають відомості, 34 тиждень 2024 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюють у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ — Київ, Суми та Чернігів, схід — Дніпро і Харків, південь — Запоріжжя й Одеса, захід — Львів, Рівне і Чернівці, центр — Кропивницький та Вінниця.

¹ Z-показник надлишкової смертності — стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами чи регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2024 року зареєстровано 260 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, зокрема 63 (24,2%) дітей віком до 17 років. З-поміж 260 пацієнтів із ГПЗ у 133 (51,2%) було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій (рис. 2).




Рис. 2. Щотижневий розподіл випадків ГПЗ серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), станом на 35 тиждень 2024 року

За результатами лабораторного дослідження 133 зразків матеріалів у 57 (42,9%) випадках отримано позитивні результати (табл. 1).

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ за 32–35 тижні 2024 року

Регіон	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтип.	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи
Вінницька	24					6	3
Дніпропетровська	12					3	1
Запорізька	13				1	8	2
Київ	6					1	
Кіровоградська	0						
Львівська	17					6	
Одеська	22					11	1
Рівненська	2					2	
Сумська	18					8	2
Харківська	0						
Чернівецька	3					1	
Чернігівська	16					1	
Усього	133				1	47	9

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного періоду зареєстровано 526 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, зокрема 194 (36,9%) дітей віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин упродовж чотирьох тижнів був у межах 2,2% (рис. 3).




Рис. 3. Щотижневий розподіл випадків ТГРІ серед дозорних закладів України (агреговано), 32–35 тижні 2024 року

З-поміж 526 випадків ТГРІ у 136 (25,9%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження у 51 (37,5%) випадку отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГРІ за 32–35 тижні 2024 року

Регіон	Узято зразків матеріалів	Грип А не субтип.	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи
Вінницька	22	1				10	
Дніпропетровська	4						1
Запорізька	7					11	
Київ	24					8	
Кіровоградська	12					6	1
Львівська	12					1	
Одеська	9					3	
Рівненська	7						
Сумська	7						1
Харківська	12					3	5
Чернівецька	0						
Чернігівська	20						
Усього	136	1				42	8